

பால்வினை நோய்கள்....



Published by:
Health education materials production unit
Department of community medicine
Faculty of medicine, university of Jaffna

Sponsored by:



Implemented by:



Assisted by:

N.Thushiyanthi(2008/fm/71)

J.P.Anpalahan(2008/fm/49)

T.Kanathipan(2008/fm/27)

E.Shanthakumar croos(2008/fm/63)

M.Shopiga(2008/fm/65)

பால்வினை நோய்கள்

- கொணோரியா
- சிபிலிசு
- கிளமிடியா
- பாலுறுப்பு ஹேர்பிஸ்
- பாலுறுப்பு உண்ணிகள்
- எயிட்ஸ்

பாலியல் மூலம் கடத்தப்படும் நோய்கள்
பிரதானமாக

- தொற்றுடையவருடனான பாலியல் தொடர்புகள்
(யோனிமடல்வழி குதவழி வாய்வழி)
- தொற்றடைந்த ஊசி
- தொற்றடைந்த தாயினுடாக குழந்தைக்கு.
கடத்தபடுகிறது.

உங்களிற்கு பாலியல் மூலம் கடத்தப்படும் நோய்
தொற்றியுள்ளது என எவ்வாறு அறியலாம்

ஆண்குறியிலிருந்தும் யோனிமடலிலிருந்தும்



வழமைக்கு மாறாக சீழ் வெளியேறல்
ஆண்குறியிலும் யோனி மடலிலும்



பொருக்குகள் தோன்றல்

விதைப்பையிலும்



யோனி மடலிலும்



வீக்கங்கள் தோன்றல்



சிறுநீர் கழிக்கும்
போது எரிவு ஏற்படல்

அடிவயிற்றில்
வலி ஏற்படல்

கொணோரியா

நோயறிகுறிகள்

பெண்:

பெரும்பாலும் தெரிவதில்லை(70-80%)
யோனிமடலிலிருந்து மஞ்சள்நிற பாயம்
வெளியேறல்
சிறுநீர் கழித்தலில் எரிவு

ஆண்:

ஆண்குறியிலிருந்து கெட்டியான மஞ்சள்
நிற பாயம் வெளியேறல்
சிறுநீர் கழித்தலில் எரிவு
அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்

கொணோரியாவும் கர்ப்பிணிகளும்

தாயிலிருந்து குழந்தைக்கு கடத்தப்பட்டு
குழந்தையில் பார்வையின்மையை
ஏற்படுத்தும்.



சிபிலிசு

நோயின் படிநிலைகளும் அதன் குணம்குறிகளும்

●1ம் படிநிலை

நோயின் தாக்கம்

பிறப்பிலிருந்து ஏற்படின் அதன் குணம் குறிகள்

பிறந்து 2-6 கிழமைக்குள் தோன்றும்.



●2ம் படிநிலை

2-3 மாதங்களின் பின்னர் தோன்றும்.



●3ம் படிநிலை

1 வருடத்தின் பின்னர்தோன்றும்,

பலவித அங்கங்களையும் தாக்கும்.



கிளமிடியா

நோயறிகுறிகள்

ஆண்களில்,

சிறுநீர் வழியினூடாக நீர் போன்ற அல்லது

சீழ் போன்ற திரவம் வெளியேறல.

விதைப்பையில் வலி.

சிறுநீர் கழிக்கும்போது எரிவு.

பெண்களில்,

70- 80% மான பெண்கள் எந்தவித

நோய்க்குணங்குறிகளையும் காட்டுவதில்லை.

கர்ப்பிணித் தாய்க்கு இந்நோய்த்தொற்று

ஏற்பட்டால் குழந்தைக்கு கடத்தப்படும்.

பாலுறுப்பு ஹோர்பிஸ்

பாலுறுப்பு பகுதிகளில், வேறு பாகங்களிலும் பருக்கள் போன்றுதோன்றும் ஆண் பெண் இருபாலரிலும் ஏற்படலாம்.



காய்ச்சல், தலையிடி, உடற்சோர்வு உடல் முழுவதும் நோவுடன் கூடியபுண்கள்.

பெண்களில் பாலுறுப்பிலும் கருப்பைக் கழுத்திலும் பருக்கள் தோன்றும். மூளையிலும் தாக்கம் ஏற்படும்.

பாலுறுப்பு உண்ணிகள்

ஆண் பெண் குறிப்பகுதியைச்சூழ பாலுண்ணிகள் தோன்றுதல்



பெண்ணில் கருப்பைக்கழுத்துப் பகுதியில்தோன்றும் பாலுண்ணிகள் கருப்பைக்கழுத்துப்புற்று நோயினை உருவாக்கலாம்.

எயிட்ஸ்

அறிகுறிகள்

- திடீரென உடல் நிறை குறைவடைதல்.
[ஒரு மாதத்திற்குள் 10Kg வரை குறைவடைதல்]
- ஒரு மாதத்திற்கு மேல் நீடிக்கும் காய்ச்சல்.
- நிணநீர் சுரப்பிகள் வீங்குதல் [நெறிபோடுதல்]
- வாயினுள் பொருக்கு ஏற்படுதல் (Candidiasis)
- இரவில் வியர்வை
- களைப்பு
- பசியின்மை

மேற்கூறிய அறிகுறிகள் ஒன்று அல்லது பல ஒரு மாதத்திற்கு மேல் நீடித்திருப்பின் HIV தொற்று தமக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் என சந்தேகிப்பவர்கள் வைத்திய ஆலோசனை நாடுவது நன்று.

இது தவிர நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைவதால் பலவிதமான நோய்கள்(கசம், ஏனைய பாலியல் நோய்கள்) தொற்றுவதற்கான சாத்தியம் அதிகம்.

உங்கள் சுகவாழ்விற்கு

நோயின் ஆரம்ப நிலைகளில் நோயை இனங்கண்டு சிகிச்சை பெறின், பின் விளைவுகளின்றி குணப்படுத்தலாம் !!!



“வந்த பின் வருந்துவதை விட வருமுன் காப்பதே மேல்”