

நெருப்புக்காய்ச்சல் இடுந்து
(Typhoid Fever)
எம்மை பாதுகாப்போம்.

நோய் பற்றி.....

- * சல்மொனெல்லா ரை.பி எனும் பற்றீரியாவால் ஏற்படுகிறது.
- * இது எமது உடலில் தொற்றி 10-14 நாட்களில் நோய் அறிகுறிகளை வெளிக்காட்டும்
- * இந்நோய், நோய்த்தொற்றுடைய நபரின் மலம், சலம் மூலமாக உணவு, நீர் என்பன மாசுபடுவதால் ஏற்படுகின்றது.
- * வீட்டு ஈ நோய்த் தொற்றலுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது.

நோயின் அறிகுறிகள்.


- * தொடர்ச்சியான காய்ச்சல் படிப்படியாக அதிகரித்தல்.
(102°F - 104°F / 40°C ற்கு மேல்)
- * வாந்தி, பசியின்மை.
- * தாகம், உடற்சோர்வு
- * முதலில் மலச்சிக்கல் பின்னர் வயிற்றோட்டம் ஏற்படும்.
- * மலம் கறுப்பு நிறமாக மாறும்.

காய்ச்சல் ஏற்பட்டு குணமடைந்த நோயாளிகளில் 5-10% ஆனவர்கள் தம் மலத்துடன் பற்றீரியாவை வெளியேற்றுகின்றனர். எனவே காய்ச்சல் மாறிவிட்டது என்ற அலட்சியம் வேண்டாம்.

- * நோயாளியாக இருந்தவருக்கு குடலில் புண்கள் காணப்படும். ஆதலால் ஒரு மாதத்திற்கு காரமான உணவு வகைகள் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

தடுக்கும் முறைகள்.

- ✱ கொதித்தாறிய நீரை அருந்துங்கள்.
- ✱ உணவை மூடி ஈக்களிலிருந்து பாதுகாத்து வையுங்கள்.
- ✱ பழங்கள், பச்சை இலை வகைகளை நன்கு கழுவிய பின்பே உண்ணுங்கள்.
- ✱ வெளியிடங்களில் திறந்து வைத்த உணவுகளை உண்ணாதீர்கள்.
- ✱ உணவுப் பொருட்களைச் சமைத்தவுடன் உண்ணுங்கள்.
- ✱ சமைக்க முன்பும், உணவு உட்கொள்ள முன்பும், மலகூடம் பாவித்த பின்பும் கைகளை சவக்காரமிட்டு நன்றாக கழுவுங்கள்.
- ✱ எப்போதும் மலசல கூடத்தில் மலம் கழியுங்கள்.
- ✱ சிறிய பிள்ளையினது மலமும் மல கூடங்களில் இடப்படவேண்டும்.
- ✱ திண்மக் கழிவுகளைச் சேகரித்து உரிய முறையில் அழிப்பதன் மூலம் இலையான் பெருக்கத்தை தடுக்கலாம்.
- ✱ கிணற்றுக்கு சரியான முறையில் குளோரின் இடுங்கள்.
- ✱ நெருப்புக் காய்ச்சலுக்கான அறிகுறிகள் இருப்பின் வைத்தியரின் உதவியை நாடுங்கள்.



நெருப்புக் காய்ச்சல் நோயாளி ஒருவர் வீட்டில் இருந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை.

* நோயாளி தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

* தேவையான வைத்திய சிகிச்சை பெறல் வேண்டும்.

* நோயாளியை, வைத்தியரால் கொடுக்கப்பட்ட மருந்துகளை வைத்தியர் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பாவிக்கவைத்தல். (காய்ச்சல் நின்றாலும் தொடர்ச்சியாக குளிசை பாவித்தல் வேண்டும்)

* நீராகாரம் அதிகளவு கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஏனைய உணவுப் பதார்த்தங்களை வைத்திய ஆலோசனையின்படி கொடுக்கலாம்.

* பராமரிப்பவர் ஒருவராக இருப்பதுடன் அவர் நோயாளியுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தும் ஒவ்வொரு முறையின் பின்பும் கைகளை சவர்காரமிட்டு நன்கு கழுவவேண்டும்.

* நோயாளியின் மலம், சலம் மலசல கூடத்தில் கழிக்கப்படல் வேண்டும், அல்லது நெருப்புத் தண்ணீர் (Pynol, Lysol) கொண்டு தொற்று நீக்கப்பட்டு, புதைக்கப்பட வேண்டும்.

* நோயாளியின் உடைகள், படுக்கை விரிப்புக்கள், துவாய் என்பன சுடுநீரில் அல்லது டெற்றோல் கலந்த நீரில் சுத்தம் செய்யப்படல் வேண்டும்.

* அனைவரும் மலகூடம் பாவிப்பது நெருப்புக் காய்ச்சல் போன்ற குடலுடன் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை நிரந்தரமாகத் தடுப்பதற்கு ஒரே சிறந்த வழி.

* சந்தேகிக்கப்படும் நோயாளிகள் உடனடியாக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படல் வேண்டும்.

* வைத்தியரின் ஆலோசனையின்றி மருந்து பாவிக்கவேண்டாம்.

* முறையற்ற நுண்ணுயிர்க் கொல்லி மருந்தை (Antibiotics) பாவிப்பதாலும் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்க முன் தாமாக நுண்ணுயிர்க்கொல்லி மருந்தை பாவிப்பதாலும் நோய்க்கிருமியை பரிசோதனையில் கண்டுபிடித்தலில் இடையூறினை ஏற்படுத்தும்.

வந்தபின் தவிப்பதை விட
வருமுன் காப்போம்

வெளியீடு:
சமுதாய மருத்துவத்துறை
யாழ் பல்கலைக்கழகம்
ஏப்ரல் 2007.

தயாரிப்பு உதவி:
B.பிரதாபன்
மருத்துவபீட மாணவன்
(2002/FM/40)
(4ம் வருடம்)



அனுசரணை:
சேவாலங்கா மன்றம்
யாழ்ப்பாணம்.