

வாய்க்குழி, தொண்டக்குழிப் புற்றுநோயைத் தவிர்ப்போம்

வெளியீடு:-

கல்விசார் பொருட்கள் தயாரிப்பு அலகு
சமுதாய - குடும்ப மருத்துவத்துறை,
மருத்துவ பீடம், யாழ்ப்பானம்

தயாரிப்பு:-

மடோனா சிறீஸ்கந்தராஜா

(2009/FM/035)

மருத்துவ மாணவி

தயாரிப்பு உதவி:-

கவுத்திய கலாநிதி. பே. அ. டினேவ் கூஞ்ஞ

உங்களுக்கு தெரியுமா?

- * வாய்ப்புற்றுநோயால் தினமும் 4 லைங்கையர் தங்கள் வாழ்வை கிழக்கிள்றவர்.
- * லைங்கையில் ஒடுங்களில் அதிகமாக காணப்படும் புற்றுநோய் வாய்ப் புற்றுநோய் ஒதும்.
- * வாய்ப் புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே அறிந்து கொண்டால் அதனை முழுமையாகக் கணப்படுத்தலாம்.

வாய்ப்புற்றுநோய் ஏற்பட அதிகம் வாய்ப்பளவுகள்

- * 30 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஒடுங்கள்
- * தினமும் 3 தடவைகளுக்கு மேல் வெற்றிலை மெல்லுவோர்
- * ஒரு நாளைக்கு 1-3 தடவைகளுக்கு மேல் வெற்றிலை மெல்லுவதுடன் புகைத்தல், மதுபானம் அருந்துவோர்
- * ஒரு நாளைக்கு “பாபுல் பீடா” எனும் பாக்கு ஓன்றாவது உட்கொள்வோர்




வாய்ப்புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்

- * வெற்றிலை, பாக்கு, சுண்ணாம்பு, பாக்குதூள், பாபுல் பீடா மெல்லுகல்
- * புகைத்தல் - சிகரட், சுருட்டு, பீடி
- * மதுபானம் அருந்துதல் -கசிம்பு, சாராயம், புளித்த கள்
- * அதிக உறைப்பான சூடான உணவுகளை உண்ணுதல்
- * வாய்ச் சுகாதாரத்தைப் பேணாமை
- * கூரான உடைந்த பற்களினாலோ / சரியான அளவிற் செய்யப்படாத செயற்கைப் பற்களினாலோ / பற்சூத்தை நிரப்ப யென்படுத்திய பதார்த்தங்கள் உடை வதனாலோ ஏற்படும் தொடர்ச்சியான உறுத்தலினால் ஏற்படலாம்.
- * இரசாயனம் பதார்த்தங்களை உட்கொள்ளல், பீடைநாசினிகளை பாதுகாப்பற முறையில் விசிறுதல்
- * கூரிய ஓளியின் அல்றாவயல் (UV) கதிர்த்தாக்கம்
- * குறிப்பாக விற்றமின் A,E போசாக்கு குறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளல்



- ❖ வாய்க்குழியில் காணப்படும் உயர்ந்த தழுத்த வெண்ணிறமான, செந்நிறமான தமும்புகள் (மிக ஆரம்ப நிலை)



- ❖ மேலணிக் கவசத்தோல் கழன்று போதல்

- ❖ உதடுகளிலோ வாய்க்குழியிலோ வளரும் / தழுக்கும் தசைத்தொகுதி



- ❖ 2 கிழமைகளுக்கு மேல் குணமாகாது நிலைத்திருக்கும் வாய்ப்புகள்

- ❖ உணவை மெல்லுவதிலோ விழுங்குவதிலோ ஏற்படும் சிரமம் / வலி

- ❖ வாய்க்குழியில் ரோத்தக் கசிவு ஏற்படல்



- ❖ பற்களின் உறுதித்தன்மை தளருதல் (முரசு, அதை அண்டிய பகுதியில் ஏற்படும் புற்றுநோய்)

- ❖ நாக்கை அசைப்பதிற் கழனம் ஏற்படுதல்

- ❖ மிகவும் பிந்திய நிலையில்

- ❖ தாடையை அசைப்பதிற் கழனம்

- ❖ நாக்கை பூரணமாக அசைக்க முடியாதவாறு வாய்க்குழியுடன் ஓட்டப்படுதல்

- ❖ கழுத்து, தாடையின் கீழ் பகுதியில் உள்ள நினைந்துக் கணுக்கள் வீக்கம் அடைதல்

வாய் பரிசோதனைக்கு
நன்றாக ஒளியுள்ள இடமும்
கண்ணாடியும் தேவை.




கைகளை சுவர்க்காரமிட்டு நீரினால் கழுவிக் கொள்ளுங்கள்.
கட்டுப் பற்கள் கிருந்தால் அவற்றைக் கழற்றுங்கள்.

உங்கள் முகத்தோற்றத்தில் ஏதாவது மாற்றம் உள்ளதா என்பதைப்பாருங்கள்.

அடுத்த படியாக பின்வருமாறு வாயை கண்ணாடி மூலம் பரிசோதித்து பார்க்கவும்.

வாயை நன்றாக அகலத் திறந்து விரல்களால் கீழ் உதட்டை கீழ் திருப்பியும், மேல் உதட்டை மேற் திருப்பியும் பரிசோதிக்கவும்.




வாயை நன்றாக அகலத் திறந்து கண்ணங்களின் உட்பிரதேசம், பக்கவாடு என்பவற்றை நன்றாகப் பரிசோதிக்கவும்.

நாக்கை நன்றாக வெளியிழுத்து நாக்கின் நுனி முதல் அடிவரை பரிசோதியுங்கள். நாக்கின் பக்கங்களையும் பரிசோதனை செய்யுங்கள்.



நாக்கை மேலுயர்த்தி நாக்கின் கீழ் பகுதியையும் வாயின் தளத்தையும் பரிசோதியுங்கள்.

நாக்கை நன்றாக வெளியிழுத்து ‘ஞ’ என கூறி உள்ளன்றுத்தைப் பரிசோதிக்கவும்



இறுதியாக கழுத்தின் கிருப்பங்களிலும் நெறிக்கப்படுகள் உள்ளனவா என அழுத்திப் பார்க்கவும்.

வாய்ப் புற்றுநோய் வராமல் தவிர்க்க..

- * வெற்றிலை போடுவதை முற்றாகவே தவிருங்கள்.
- * பாக்கு உண்பதை தவிருங்கள்.
- * புகைத்தலையும் மதுபானத்தையும் தவிருங்கள்.
- * சுகாதாரமான முறையில் வாயைப் பேனுங்கள்
- * பழங்களையும் மரக்கறி வகைகளையும் அதிகளாவில் உண்ணுங்கள்.



* எனிய வாழ்க்கை முறையையும் மன ஒழுநல் பயிற்சியையும் கைக்கொள்ளுங்கள்.

- * 6 மாதத்திற்கு ஒரு தடவை உங்கள் வாயை வைத்தியரைக் கொண்டு பரிசோதியுங்கள்.



தொண்டைக்குழிப் புற்றுநோய்


இலங்கையில் வயதான ஆஸ்களில் அதிகளாவில் காணப்படுகிறது.



ஏதுவான காரணிகள்

- * புகைத்தல் - சிகிரட், சுருட்டு, பீழ்
- * மதுபானம் அருந்துதல் - கசிப்பு, சாராயம், புளித்த கள்
- * புகையிலை மெல்லுதல்
- * மூக்குப் பொழி பாவித்தல்
- * ரேசாயனங்களை உள்ளெடுத்தல்
- * தொழில் சார்ந்த பாதிப்புக்கள் - நிக்கல், அஸ்பெஸ்ரோஸ் (Asbestos) என்பனவற்றுடன் தொடர்பான தொழிலில் ஈடுபடுதல்
- * மனித பாலுண்ணி வைரஸ் (Human Papilloma Virus)/ எப்ஸ்ரைன் பார் வைரஸ் (Epstein bar virus) தொற்று
- * போசாக்கின்மை- விற்றயின்கள், சுவட்டு தாதுப்பொருட்கள் குறைவாக உட்கொள்ளல்

- * குரல் கரகரப்படைதல் (> 2கிழமைகள்)
 - * உணவு விழங்குவதில் கடனம்/
நோவு ஏற்படல்
 - * முச்சு விடுவதில் கடனம்
 - * துய்நாற்றமுடைய சுவாசம்
 - * கிருமல் சளியுடன் ரெத்தம் கலந்து வெளியேறல்
 - * கழுத்து, தாடையின் கீழ், காதுப் பகுதியில் உள்ள
நினைநீர் முழச்சுக்கள் வீக்கமடைதல்
- அறிகுறிகள் ஏற்படுமெட்டது தாமதமின்றி வைத்திய
ஞூலோசனை பெறவும்.**



தொண்டைக்குழிப் புற்றுநோயை
ஞூம்பத்திலேயே ஏறிந்து கொண்டால்
அதனை முழுமையாகக் குணப்படுத்தலாம்.

இப் புற்றுநோய்க்கு ஏதுவான காரணங்களை
தவிர்ப்பதன் மூலம் புற்றுநோய்
உஞ்வாக்கத்தை தடுக்கலாம்.



அனுசரணை:-

நல்லூர் யென்ஸ் கழகம்